

## VITARIS AMINOÁCIDOS

/ BIOESTIMULANTES

**FICHA TÉCNICA** 

Composición	%p/v		
Aminoácidos	37.5 %		
Alanina	2.65		
Arginina	5.09		
Ácido aspártico	4.01		
Cisteina	0.18		
Ácido glutámico	4.83		
Glicina	2.47		
Histidina	0.44		
Isoleucina	0.40		
Leucina	0.70		
Lisina	1.05		
Metionina	0.23		
Fenilalanina	0.93		
Prolina	4.07		
Serina	4.44		
Treonina	3.59		
Triptófano	0.05		
Tirosina	0.34		
Valina	2.02		
Nitrógeno total	5.40		
Formulación	Concentrado Soluble (SL)		
Formulador	Aris Industrial S.A.		
Procedencia	Perú		



magen referencial.

#### **BENEFICIOS**

- Bioestimulante con certificación orgánica.
- Mejorar la absorción de nutrientes a través de las raíces.
- Aumentar la resistencia del cultivo a condiciones de estrés por sequía, heladas, salinidad, granizo y/o enfermedades.
- Favorece la recuperación post estrés.
- Potencia el metabolismo y la recuperación del cultivo en caso de una intoxicación por productos agroquímicos.
- Cumple con el reglamento UE, sobre metales pesados.



### VITARIS AMINOÁCIDOS

BIOESTIMULANTES

**FICHA TÉCNICA** 

#### **APLICACIONES**

Cultivo	Dosis		- Momento de aplicación
	L/200L	L/ Ha	- Momento de aplicación
Uva de mesa, palto, arándanos, cítricos, mango, olivo, limón, tahiti, granada y durazno	-	2 - 4	Se puede aplicar a lo largo de todo el desarrollo vegetativo, se recomienda un mínimo de 2 a 4 aplicaciones.  Se puede aplicar a lo largo de toda la fase reproductiva, se recomienda un mínimo de 3 aplicaciones entre pre floración, cuajado y desarrollo inicial del fruto.
Maíz, arroz, papa, leguminosas y quinua	0.5 - 1.0	-	De 1 a 2 aplicaciones en desarrollo vegetativo. De 1 a 2 aplicaciones en desarrollo reproductivo.
Tomate, capsicum y fresa.	0.5 - 1.0	-	De 1 a 2 aplicaciones en desarrollo vegetativo. De 3 a 4 aplicaciones entre pre floración, cuajado y desarrollo de frutos.
Cebolla y ajo	-	1 - 3	De 2 a 3 aplicaciones en desarrollo vegetativo. De 3 a 4 aplicaciones en formación y desarrollo de bulbo.
Banano	0.5 - 1.0		En crecimiento vegetativo, a la emergencia del racimo y repetir a los 20 días.
Alcachofa y espárrago	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0	Al trasplante, repetir cada 15 días. A la inducción floral, a partir del 2do brote, repetir aplicaciones cada 20 días.

Como recomendación general, VITARIS AMINOÁCIDOS puede ser aplicado para prevenir o recuperar al cultivo de cualquier situación de estrés, por ejemplo: bajas temperaturas, falta de agua, excesiva carga del cultivo, etc.

#### **PRESENTACIONES**

1L, 5L, 20L y 200 L.

#### CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



vMantener bajo llave



secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar



alcance de niños y animales



(Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.

> Fecha de emisión: 27/12/2024 | Fecha de revisión: var\_act\_fecha Versión: 01



# VITARIS AMINOÁCIDOS

BIOESTIMULANTES

FICHA TÉCNICA