

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



ATENCIÓN
Provoca irritación
ocular grave.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Lavarse las manos y la cara cuidadosamente después de la manipulación.
Usar guantes de protección/ equipo de protección para los ojos/la cara.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:

- **Contacto con la piel:** Enjuagar la piel con agua durante 15-20 minutos.
- **Contacto con los ojos:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante 15-20 minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
- **Ingestión:** Enjuagarse la boca. No provocar el vómito.
- **Inhalación:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

En caso de EMERGENCIA llame a: SAMU: 106

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

Luego de usar el contenido total, enjuague el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Perfere el envase y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local competente para este fin.



FOSFITO DE POTASIO BIOESTIMULANTES



SAFE FIELDS. Aris garantiza que el producto cumple con las concentraciones mínimas de metales pesados con referencia al Reglamento Unión Europea 2019/1009.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto:
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



VITARIS FOSFITO DE POTASIO es una solución concentrada de 540 g/L fosfito de potasio, el cual actúa como un inductor de fitoalexinas, diseñado para ser aplicado vía foliar, sistema de riego y vía drench.

BENEFICIOS

- Estimula la defensa natural de las plantas.
- Altamente sistémico vía xilema y floema.
- Herramienta útil en los programas de manejo integrado de enfermedades.
- Cumple con el reglamento UE, sobre metales pesados.

Composición % p/v

Fósforo (P ₂ O ₅)	35%
Potasio (K ₂ O)	27%
Fosfito de Potasio	54%
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble (SL)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para las aplicaciones foliares, trabajar con la dosis en L/200L.

Para las aplicaciones vía sistema de riego, trabajar la dosis en L/ha.

Cultivo	Dosis		Momento de aplicación
	L/200L	L/ha	
Habas, frijol, holantao y pallar	0.5	1 - 2	15 días después de la emergencia, pre floración y floración.
Limón, tangelo, naranja, mandarina, manzano, durazno, palto, mango, café y cacao	0.3 - 0.5	3 - 5	Entre brotación y floración 2 semanas después del cuajado del fruto.
Vid	0.3 - 0.5	3 - 5	En brote de 5 a 10 cm, con baya de 5 mm y en pinta.
Ají páprika, pimiento piquillo y tomate.	0.3 - 0.5	2 - 4	30 días después de la emergencia. Pre floración. Después del cuajado.
Arroz	0.5 - 1	1 - 2	En almacigo, macollamiento y punto de algodón.
Espárrago	0.5 - 1	2 - 4	A inicios del brotamiento, 7 días después y de 20 a 30 días después.
Ajo y cebolla	0.5 - 1	2 - 4	15 días después del trasplante, repetir cada 20 días.
Papa	0.5 - 1	1 - 2	30 días después de la emergencia, repetir cada 20 días.
Palto	0.5 - 1	3 - 5	Aplicar en brotación y 30 días después del cuajado.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas. No mezclar productos de reacción alcalina ni con nitratos. No se han reportado problemas de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO EN PERÚ POR:
ARIS INDUSTRIAL S.A. | RUC: 20100257298
Av. Industrial 491 Lima - Perú | Telf.: (01) 336 5428
vquimicos@aris.com.pe | www.aris.com.pe

ARIS